

日本標準商品分類番号	8 7 9 6 2 5
承認指図書番号	16消安第5805号

貯 法	遮光した気密容器
-----	----------



ビタミンE (α -トコフェロール) は抗不妊因子として発見された脂溶性ビタミンであるが、近年に至り、細胞膜などの生体膜安定化作用及び過酸化物質生成の抑制作用が立証された。これらの作用は、各種動物のホルモン分泌・妊娠機能、骨格・心臓筋肉機能、肝臓代謝機能、脂肪代謝機能、循環器機能などの維持・改善に重要な役割を果たしている。本剤はこの α -トコフェロールを安定性の優れたアセテートタイプで水溶化したビタミンE乳液剤である。

成分及び分量

1mL中に日局トコフェロール酢酸エステル50mg (ビタミンE50国際単位) を含有する。

効能又は効果

1. ビタミンEの補給
2. ビタミンE欠乏症による下記疾病(症状)の予防と治療
 - 犬 : 運動器障害、筋ジストロフィー症、繁殖障害
 - 猫 : 運動器障害、筋ジストロフィー症、黄色脂肪症
 - ミンク: 運動器障害、筋ジストロフィー症、黄色脂肪症、繁殖障害

用法及び用量

1頭1日あたり、下記の量を経口投与する。ストレスの程度や症状に応じて用量および投与期間を適宜増減する。

犬 : ビタミンEの補給および予防には、本剤0.04~1mL(トコフェロール酢酸エステルとして2~50mg) 治療には、本剤1~6mL(トコフェロール酢酸エステルとして50~300mg)

猫・ミンク: 本剤0.02~0.8mL(トコフェロール酢酸エステルとして1~40mg)

使用上の注意

(基本的事項)

- 1 守らなければならないこと
 - 【一般的注意】
 - (1) 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
 - (2) 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
 - 【取扱い及び廃棄のための注意】
 - (1) よく振り混ぜてから使用すること。
 - (2) 本剤は添付のスポイト(目盛り: 0.25mL、0.5mL、1.0mL) で計量し、餌、ミルク、スープなどによく混ぜて投与すること。
 - (3) 小児の手の届かないところに保管すること。
 - (4) 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
 - (5) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

- (6) 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- (7) 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 2 使用に際して気を付けること
 - 【使用者に対する注意】
 - (1) 誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
 - 【対象動物に関する注意】
 - (1) 本剤の投与前に健康状態について観察し、異常が認められた場合には使用しないこと。
 - (2) 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

包 装

メイロング液……………50mL (スポイト付)

【製品情報お問い合わせ先】

明治アニマルヘルス株式会社 営業部
〒860-8568
熊本市北区大窪一丁目6番1号
TEL:096(345)6505
FAX:096(345)7879
<https://www.vet.meiji.com/>

販売元

meiji 明治アニマルヘルス株式会社

熊本市北区大窪一丁目6番1号

製造販売元



株式会社 科学飼料研究所
東京都中央区八丁堀三丁目3番5号

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。