

動物用医薬品

2022年4月改訂  
貯法 遮光、気密容器

承認指令書番号 28 動薬第413号

## ビタミン水性液 ニュートリミックス<sup>®</sup>液-C

### 成分及び分量 (100mL中)

日局ビタミンA油 (100万ビタミンA単位) ……………	1,200mg
日局コレカルシフェロール (ビタミンD <sub>3</sub> ) ……………	6mg
日局トコフェロール酢酸エステル……………	1,500mg
日局フィトナジオン……………	25mg
L-アスコルビン酸ナトリウム……………	5,624mg
パンテノール……………	240mg

### 効能又は効果

1. 脂溶性及び水溶性ビタミンの補給
2. 脂溶性及び水溶性ビタミンの欠乏による疾病の予防と治療

### 用法及び用量

鶏及びうずらの飲水に添加して投与する。  
体重1kg当たり本剤0.05～0.3mLを1日量として投与するが、1,000羽1日当たりの標準用量を、成鶏100～200mL、大雛50～100mL、中雛30～70mL、幼雛20～50mLとする。

### 使用上の注意

(基本的事項)

#### 1 守らなければならないこと

##### 【一般的注意】

- (1) 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- (2) 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- (3) 本剤は鶏及びうずら専用なので、他の動物種には使用しないこと。
- (4) プロイラーの出荷直前に投与すると鶏体や消化器系(筋胃等)が赤く着色することがある。出荷直前の投与はしないこと。

##### 【鶏・うずらに関する注意】

- (1) 本剤の投与前に健康状態について観察し、異常が認められた場合には使用しないこと。
- (2) ビタミンDは過量投与による中毒(骨の脱カルシウム、軟組織化骨等)が殆ど全ての動物種で報告されている。過量投与は避けること。

##### 【取扱い及び廃棄のための注意】

- (1) 本剤は他の医薬品(ワクチン、抗生物質、消毒薬など)との混合投与を行わないこと。
- (2) 使用の期限を過ぎたものは使用しないこと。
- (3) ビタミンAはアルカリ性、日光によって急速に分解される。飲水への混和は使用時に行うこと。
- (4) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (5) 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- (6) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (7) 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- (8) 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

#### 2 使用に際して気を付けること

##### 【鶏・うずらに関する注意】

- (1) 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- (2) ビタミンAは過量投与によるビタミンA過剰症状(皮膚の変色、骨の肥大性増殖等)が起こることが報告されている。
- (3) 鶏、七面鳥においてビタミンE大量投与下(30、150mg/kg)でワクチン等による抗体産生能が低下するとの報告がある。

##### 【取扱い上の注意】

- (1) 連日投与すると、給水パイプが目詰まりを起こすことがある。投与する時は午前中に薬液を飲みし切り、その後は真水を給与すること。

#### 【製品情報お問い合わせ先】

明治アニマルヘルス株式会社 営業部  
〒860-8568 熊本市北区大塚一丁目6番1号  
TEL : 096(345)6505 FAX : 096(345)7879  
<https://www.vet.meiji.com/>

販売元  
明治アニマルヘルス株式会社  
熊本市北区大塚一丁目6番1号

製造販売元  
株式会社 科学飼料研究所  
東京都中央区八丁堀三丁目3番5号

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所(<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>)にも報告をお願いします。



紙 使用の期限  
ラベル 内容器:PE 製造番号  
キャップ:PE ETXC  
ETXC-A 2204