

サルファ剤

指定医薬品 使用基準

水産用ダイメトン®散

Daimeton® Powder for Fishes

【本質の説明又は製造方法】

スルファモノメトキシンは、我が国だけでなく広く海外でも使用されているサルファ剤で、本剤はこのスルファモノメトキシンを水産用として投与しやすくした粉末10%散剤です。

【成分及び分量】

品名	水産用ダイメトン散
有効成分	日局スルファモノメトキシ水和物
含量	100g中 10g

【効能又は効果】

スルファモノメトキシ感受性菌に起因する下記疾病魚類の死亡率の低下。

すずき目魚類：ピブリオ病、ノカルジア症
うなぎ目魚類：ひれ赤病
淡水中で飼育するにしん目魚類：ピブリオ病、せつそう病

【用法及び用量】

魚体重1kg当たり1日量スルファモノメトキシとして下記の量を飼料に均一に混ぜて経口投与する。

すずき目魚類（ピブリオ病の場合）：100～200mg
（本剤として1～2g）
すずき目魚類（ノカルジア症の場合）：25～50mg
（本剤として0.25～0.5g）
うなぎ目魚類：150～200mg
（本剤として1.5～2g）
あゆを除く淡水中で飼育するにしん目魚類：100～150mg
（本剤として1～1.5g）
あゆ：100mg
（本剤として1g）

【使用上の注意】

「基本的事項」

1 守らなければならないこと

（一般的注意）

- 本品は指導機関（家畜保健衛生所、魚病診断総合センター、水産試験場等）に相談の上使用すること。
- 本品は、すずき目魚類のピブリオ病及びノカルジア症、にしん目魚類（淡水中で養殖されているもの。）のピブリオ病及びせつそう病、うなぎ目魚類のひれ赤病を治療するために使用し、すずき目魚類、にしん目魚類（淡水中で養殖されているもの。）若しくはうなぎ目魚類以外の魚又は動物には使用しないこと。
- 本品は、適切な量で使用しないと期待される治療効果が得られず、これを超えて使用した場合には、思わぬ副作用が発生するおそれがあることから、本使用説明書の【用法及び用量】に従って正しく使用すること。
- 本品は、病気の治療に必要な最小限の期間の使用に止めることとし、病気が治まった後は使用しないこと。また、治療の効果の有無にかかわらず、8日間以上の連続投与は避け、繰り返し使用しないこと。
- 本品は「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注意：

本剤は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、すずき目魚類・うなぎ目魚類・にしん目魚類（淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。）・あゆについて上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守して下さい。

すずき目魚類：食用に供するために水揚げする前15日間
うなぎ目魚類（うなぎにあつては、体重100g以下のもの及び食用に供するために水揚げする前30日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におかれる体重100gを超えるもの）
にしん目魚類：食用に供するために水揚げする前30日間
（淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。）
あゆ：食用に供するために水揚げする前30日間
あゆ：食用に供するために水揚げする前15日間

- 本品を放流用のあゆに使用する場合、放流河川の鮎釣り解禁前15日間（使用禁止期間）は使用しないこと。放流河川の鮎釣り解禁後に放流する場合には本品使用後15日間は放流しないこと。

（取扱い及び廃棄のための注意）

- 本品は、小児の手の届かないところに保管すること。
- 本品は、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。
- 本品を数回に分けて使用する場合には、すみやかに使用すること。
- 本品の色に異常が認められた場合には使用しないこと。
- 使用済みの空容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分し、他に流用又は転用しないこと。
- 本品を廃棄する場合には、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。

2 使用に際して気をつけること

（使用者に対する注意）

- 誤って本品を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- 餌等に混合する際は、マスク等を着用し、粉じん等を吸い込まないように注意すること。
- 本品は動物用医薬品であるため、人体用に使用しないこと。

（対象動物に関する注意）

- 本品を体重100gを超えるうなぎ目魚類に使用した場合は、食用に供するために水揚げする30日間は、飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におくこと。この条件におくことができない場合には、体重100g以下のうなぎ目魚類に限って本品を使用すること。
- 投薬と他のストレスが重なった場合には死亡が起こる可能性があるため、投薬中、及び投薬後少なくとも6日間は移動など魚の取扱いを極力避け、魚にストレスを与えないようにすること。
- 台風や赤潮等の被害を回避するために魚の移動をしなければならない場合は投薬を避けること。
- 定められた用量であっても摂餌の偏りから過剰投与になるおそれがあるため、均一に混合された飼料を給餌し、一回当たりの給餌が長時間に亘らないようにすること。

・副作用

本品は定められた用量であっても副作用がでるおそれがあるため、下記の点につき留意すること。

- 本品の投与によって魚に体色変化や摂餌欲の減退が生じる可能性がある。
- 本品の投与によって魚に肝臓及び腎臓等の障害を起こす可能性がある。
- 摂餌行動が顕著に不活発になった場合には投与を中止すること。

（取扱い上の注意）

- 本品は、よく振り混ぜてから使用すること。

【薬理学的情報等】

（薬効薬理）

スルファモノメトキシンは、ジヒドロプロテロイン酸合成酵素を競合的に阻害し、葉酸合成を阻害する。スルファモノメトキシンの作用は静菌的である。

【包装】

水産用ダイメトン散 10kg（1kg×10分包）

【製品情報お問い合わせ先】

明治アニマルヘルス株式会社 営業部
〒860-8568
熊本市北区大窪一丁目6番1号
TEL：096(345)6505
FAX：096(345)7879
<https://www.vet.meiji.com/>

【製造販売元】

meiji 明治アニマルヘルス株式会社
東京都中央区京橋2-4-16

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所（<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>）にも報告をお願いします。